

Förberedelser för elkonvertering

Observera att PK INR-värdet ska ligga mellan 2,1 – 3,0 under minst tre veckor före planerad elkonvertering. Är detta ej fallet hör av dig till hjärtmottagningens sjuksköterskor.

På morgonen dagen före elkonverteringen ska du ta ett blodprov. Detta görs på ett lab som tillhör Karolinska universitetslaboratoriet. Din provtagningsremiss är elektroniskt överförd. Du behöver inte vara fastande.

Du ska komma fastande till sjukhuset. Du ska ej äta eller dricka efter klockan 24 dagen innan men du får dricka ett halvt glas vatten till dina mediciner på morgonen. Om du inte fått annat besked ska du ta dina mediciner som vanligt.

Särskild

ordination:.....

.....

.....

Gå först till kassan, kl 07:30, där blir du registrerad som dagpatient, kostnad enligt gällande taxa. Frikort gäller.

Gå sedan till Kem Lab för PK/INR-provtagning, plan 2 (hiss B). Tag nummerlapp för AKUT provtagning.

Gå sedan till Kirurgmottagningens Screeningmottagning, som öppnar 07:30, på plan 1 i huvudbyggnaden, för snabbtest av Covid-19.

Gå sedan vidare till hjärtmottagningen, som ligger på Utsikten, Fjällgatan 45.

På hjärtmottagningen tar vi ett EKG och visar det fortsatt förmaksflimmer får du komma till dagvårdsavdelningen. Där sätts en infartskanyl i ett blodkärl och ett dropp med koksalt. Elkonverteringen utförs på operations- eller uppvakningsavdelningen. Narkosläkare ger ett kortverkande sömnmedel i kanylen och under tiden du sover ger hjärtläkaren en strömstöt via två spatlar på bröstorgans framsida. Behandlingen tar cirka tio minuter. När du vaknat till får något att äta och dricka.

Ibland kan huden, där spatlarna varit, rodna och man kan då använda hydrokortisonsalva för att minska irritationen (finns receptfritt på apoteket).

Före hemgång får du träffa ansvarig läkare, ta ett nytt EKG, få besked om fortsatt medicinerings och uppföljning. Du kommer att fortsätta med blodförtunnande behandling till läkaren beslutar något annat.

Oftast planeras ett återbesök hos sjuksköterska efter 7-10 dagar för att kontrollera om hjärtat fortsätter att gå i takt eller om du fått ett återfall till förmaksflimmer. Återbesök till läkare planeras fem till sex veckor efter elkonverteringen.

ERSTA SJUKHUS

Du bör inte köra bil själv hem efter elkonverteringen då uppmärksamheten kan vara nedsatt efter sövningen.