



Ersta diakoni

Patientinformation inför elkonvertering med Lixiana eller Xarelto

Du behandlas med det blodförtunnande läkemedlet.....

Din läkare har bestämt att du skall genomgå en elkonvertering för att behandla din rytmstörning som kallas förmaksflimmer. En elkonvertering innebär att du kommer att få en kortvarig narkos och genom en liten strömstöt mot bröstkorgen försöker man få hjärtat att återgå till regelbunden rytm igen.

För att elkonverteringen skall kunna genomföras utan risk för komplikationer är det mycket viktigt att du hela tiden tar din blodförtunnande medicin enligt ordination. Utebliven eller överhoppad dos kan leda till att din planerade elkonvertering kommer att ställas in.

Under TRE veckor före planerad elkonvertering måste du ta din blodförtunnande medicin varje morgon.

I bifogat schema ber vi dig dagligen signera varje intagen dos av läkemedlet Xarelto. Detta för att säkerställa att du har haft en fullgod blodförtunning fram till behandlingen. Det signerade och ifyllda schemat måste du ta med dig till mottagningen för att kunna visa upp för den läkare som skall utföra elkonverteringen.

Har du glömt en dos eller känner dig osäker ber vi dig snarast kontakta hjärtmottagningen för att få råd om hur du skall göra. Telefon 08 – 714 62 10 (hjärtmottagningen, Ersta sjukhus).

Jag har tagit del av informationen och förstår vikten av att signera alla intagna doser under TRE veckor innan elkonverteringen. Jag är medveten om att elkonverteringen kan komma att ställas in om behandlande läkare inte säkert kan dokumentera att min blodförtunning varit tillräcklig eller att doser saknas.

Namn:.....

Personnummer:.....

Underskrift:.....

Datum:.....